

LUCERNA

GEA, PLATO, VERKO

VÖRÖSHERE

ALTASWEDE

FEHÉRHERE

HUIA

BÍBORHERE

LOVÁSZPATONAI

SZARVASKEREP

LEO

ALEXANDRIAI HERE

ALEX

KOMLÓS LUCERNA

VIRGO PAJBJERG

TAVASZI BÜKKÖNY

BETA 11

PANNON-BÜKKÖNY

BETA

PILLANGÓS VETŐMAGKÍNÁLAT 2017

ŐSZI BÜKKÖNY

VILLANA

BALTACIM

CSILLAGFÜRT

Székhely

9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy utca 12.
Tel./Fax: +36 96 204 079

Raktár

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 1/a

e-mail: info@pannonmag.hu

www.pannonmag.hu



PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

LUCERNA: Gea, Plato, Verko

- jó minőségű, mély termőrétegű, megfelelő vízháztartású talajokon természetesen sikerrel
- gyökérzete mélyre hatoló, ezért szárazságtűrése kiváló
- nagy tömegű, és igen értékes, fehérjékben gazdag takarmányt nyújt
- GEA: kiváló szárazságtűrés és levél-szár arány
- PLATO: magas fehérjehozam, kiváló minőségű szenázs
- VERKO: magas terméspotenciál, kiváló szárazanyagtartalom, sokoldalú hasznosítás

Vetési idő: III. 10.–IV. 15. VIII. 10.–VIII. 25.

Vetőmagszükséglet: 15–25 kg/ha

VÖRÖSHERE: Altaswede

- rosszabb adottságú talajokon is sikerrel természetesen
- jó télálló faj
- szénája a lucernához hasonlóan jó takarmányértékű

Vetési idő: III. 01.–IV. 15., VIII. 01.–IX. 15.

Vetőmagszükséglet: 14–23 kg/ha

FEHÉRHERE: Huia

- üde talajok nagyszerű takarmánynövénye
- taposást jól bírja, nagyon jól sarjad
- tápanyagként kiváló, ezért legelő keverékek igen jól használható alkotója

Vetési idő: III. 10.–III. 31.

Vetőmagszükséglet: 6–10 kg/ha

BÍBORHERE: Lovászpatonai

- egyéves, áttelelő takarmánynövény
- nagyon gyors tenyészidejű, másodvetésként is vethető
- kiváló zöldtakarmányt ad

Vetési idő: VIII. 01.–VIII. 30.

Vetőmagszükséglet: 30–35 kg/ha

SZARVASKEREP: Leo

- hosszú életű, kis igényű, üde termőhelyet kedvelő, jó téltűrő takarmánynövény

Vetési idő: III. 10.–31.

Vetőmagszükséglet: 10–15 kg/ha, többnyire keverékekben alkalmazzuk

ALEXANDRIAI HERE: Alex

- Egy éves pillangós növény, meleg-, és üde fekvésű termőhelyen ad jó termést.
- Elsősorban intenzív perjefélékkel keverékben vessük.

Vetési idő: III. 25.–IV. 31. VIII. 10.–VIII. 31.

Vetőmagszükséglet: 30–35 kg/ha

KOMLÓS-LUCERNA: Virgo Pajbjerg

- Egy-, esetleg két évig élő, bokros növekedésű-, a rágást és tiprást jól tűrő faj
- magas mésztartalmú, meleg talajok növénye

Vetési idő: III. 10.–IV. 15., VIII. 15.–VIII. 31.

Vetőmagszükséglet: Keverékekben szerepel.

PILLANGÓS VETŐMAGKÍNÁLAT 2017

TAVASZI BÜKKÖNY: Beta 11

- jó vízháztartású-, és minőségű- talajokat kedveli.
- tavaszi zab-, vagy búza támasztónövénnyel vetik

Vetési idő: III. 01.–31.

Vetőmagszükséglet: 90–120 kg/ha vagy

Keverékben: tavaszi bükköny (80–100 kg)
+ zab (35–45 kg)

PANNON-BÜKKÖNY: Beta

- rosszabb adottságú talajokon is sikerrel természetesen
- jó télálló faj
- szénája a lucernához hasonlóan jó takarmányértékű

Vetési idő: III. 01.–IV. 15., VIII. 01.–25.

Vetőmagszükséglet: 14–23 kg/ha

ŐSZI BÜKKÖNY: Villana

- nagy fehérje tartalom
- kiváló zöldtakarmány

Vetési idő: IX. 10.–31.

Vetőmagszükséglet:

Keverékben:

- szeszös bükköny (65–70 kg) + rozs (70 kg)

- szeszös bükköny (50–60 kg) + búza (85 kg)

BALTACIM

- 5–6 éven keresztül jó minőségű takarmányhozamot nyújt
- szárazságtűrése kiváló

Vetési idő: III. 10.–IV. 10.

Vetőmagszükséglet: 120–150 kg/ha

CSILLAGFÜRT

- lazább, homokosabb talajok takarmánynövénye
- magas nitrogényűjtő képesség

Vetési idő: III. 15.–IV. 15.

Vetőmagszükséglet: 120–140 kg/ha



PANNON-MAG-AGRÁR KFT.